

วิธีจำแนก นกชายเลนในเมืองไทย



อันดับนกชายเลน (Order Charadriiformes)



นกคุ่มอืด (Turnicidae)



นกกระแตผี (Burhinidae)



นกหัวโตกินปู (Dromadidae)



นกตีนเทียน (Recurvirostridae)



นกหัวโต (Charadriidae)



นกโป่งวิด (Rostratulidae)



นกพริก (Jacanidae)



นกชายเลน (Scolopacidae)



นกแอ่นทุ่ง (Glareolidae)



นกนางนวล (Laridae)



นกสกัว (Stercoraciidae)

วงศ์นกหัวโต (Charadriidae)

3 สกุล (genus) มีทั้งขนาดตัวใหญ่ (นกกระแต) และขนาดปานกลางไปจนถึงเล็ก ปากสั้น ขาวยาว อาศัยวิธีเดินและหยุดเพื่อมองหาเหยื่อ

Vanellus

1. นกกระแตหงอน (Northern Lapwing; *Vanellus vanellus*)
2. นกกระแตหาด (River Lapwing; *Vanellus duvaucelii*)
3. นกกระแตหัวเทา (Grey-headed Lapwing; *Vanellus cinereus*)
4. นกกระแตแต้แว๊ด (Red-wattled Lapwing; *Vanellus indicus*)

Pluvialis

1. นกหัวโตหลังจุดสีทอง (Pacific Golden Plover; *Pluvialis fulva*)
2. นกหัวโตสีเทา (Grey Plover; *Pluvialis squatarola*)

Charadrius

1. นกหัวโตเล็กขาส้ม (Common Ringed Plover; *Charadrius hiaticula*)
2. นกหัวโตปากยาว (Long-billed Plover; *Charadrius placidus*)
3. นกหัวโตเล็กขาเหลือง (Little Ringed Plover; *Charadrius dubius*)
4. นกหัวโตชาดำ (Kentish Plover; *Charadrius alexandrinus*)
5. นกหัวโตหน้าขาว (Swinhoe's Plover; *Charadrius dealbatus*)
6. นกหัวโตมลายู (Malaysian Plover; *Charadrius peronii*)
7. นกหัวโตทรายเล็ก (Lesser Sand Plover; *Charadrius mongolus*)
8. นกหัวโตทรายใหญ่ (Greater Ringed Plover; *Charadrius leschenaultii*)
9. นกหัวโตขาขาว (Oriental Plover; *Charadrius veredus*)

นกหัวโตหลังจุดสีทอง

Pacific Golden Plover (*Pluvialis fulva*)



Non-breeding

ลำตัวด้านบนมีลายจุด
สีเหลืองและน้ำตาล
เข้มกระจายทั่วไป

โทนสีโดยรวมออกน้ำตาลเหลือง



Breeding

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีใบหน้าและลำตัว
ด้านล่างสีดำ ล้อมรอบด้วยสีขาว
บริเวณข้างหัวและสีข้าง



Breeding

นกหัวโตขนาดใหญ่ พบได้ในพื้นที่หลายประเภท เช่น นาเกลือ ชายหาด อ่างเก็บน้ำ ทุ่งนา และพื้นที่เกษตรกรรม
มักหากินเดี่ยวๆ ปะปนกับนกชายเลนชนิดอื่น หรือรวมฝูงในช่วงนอนพัก



นกหัวโตสีเทา

Grey Plover (*Pluvialis squatarola*)



ลำตัวโดยรวมสีเทาปนน้ำตาล
ไม่มีจุดสีเหลือง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีใบหน้าและลำตัว
ด้านล่างสีดำ ลำตัวด้านบนเป็น
ลายสีขาวและดำ

นกหัวโตขนาดใหญ่ รูปทรงและอุปนิสัยคล้ายนกหัวโตหลังจุดสีทอง แต่พบเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายฝั่งเป็นหลัก รายงานจากแหล่งน้ำจืด น้อยมาก มักหากินเดี่ยวๆ ปะปนกับนกชายเลนชนิดอื่น หรือรวมฝูงในช่วงนอนพัก

ขณะบินเห็นแถบสีดำ
ที่ใต้ปีกชัดเจน



นกหัวโตเล็กขาสั้น

Common Ringed Plover (*Charadrius hiaticula*)



Non-breeding

© Dave Bakewell

หัวกลมโตและคอสั้นกว่า
รวมทั้งปากสั้นและปลายมน
กว่านกหัวโตเล็กขาเหลือง

ไม่มีวงรอบตา

ปกติขาสีเข้มกว่านกหัวโตเล็ก
ขาเหลือง แต่ไม่ควรใช้เป็นจุด
จำแนก เพราะอาจแปรผันได้



© Dave Bakewell

Common Ringed

Little Ringed

ขนาดตัวโตกว่านกหัวโตเล็กขาเหลือง (ล่าง)
เล็กน้อย หัวโต คอสั้น ปากสั้นกว่า



Breeding

© Dave Bakewell

นกหัวโตขนาดเล็ก หายากมาก มีเพียง
ไม่กี่รายงานเท่านั้นจากริมแม่น้ำโขง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย แต่มีรายงาน
อพยพไปถึงมาเลเซีย และสิงคโปร์



© Dave Bakewell

นกหัวโตเล็กขาเหลือง

Little Ringed Plover (*Charadrius dubius*)



Non-breeding

ปากยาวแหลมกว่า
นกหัวโตเล็กขาส้ม

วงรอบตาสีเหลือง

ขาสีเหลือง บางตัว
อาจเป็นสีเหลืองซีด
เหลืองอมชมพู หรือ
เหลืองอมส้ม



Immature

ชนิดย่อย *jerdoni* ช่วงฤดูผสมพันธุ์
มีวงตาหนากว่าเล็กน้อย แถบดำ
บริเวณอกแคบกว่า สีขาวบน
หน้าผากกว้างกว่า



ชนิดย่อย *curonicus* เป็นนกอพยพที่พบได้ทั่วไปตาม
แหล่งน้ำหลายประเภท ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ส่วนชนิด
ย่อย *jerdoni* เป็นนกประจำถิ่นตามแม่น้ำและแหล่งน้ำ
ขนาดใหญ่ทางภาคเหนือ อีสาน และตะวันตก



Breeding

Ssp. curonicus

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีแถบสีดำคาดอก ใบหน้า และ
หน้าผาก วงตาสีเหลืองหนาชัดเจนขึ้น



Breeding

Ssp. jerdoni

นกหัวโตปากยาว

Long-billed Plover (*Charadrius placidus*)

นกหัวโตขนาดเล็ก หายาก รายงานส่วนมากมาจากแหล่งน้ำจืดทางภาคเหนือ เช่น แม่น้ำสายใหญ่ หรือบางครั้งในทุ่งนา



ปากยาวกว่านกหัวโตขนาดเล็กชนิดอื่นค่อนข้างชัดเจน

มีวงรอบตาสีเหลือง แต่เห็นไม่ชัดเจนเท่า นกหัวโตเล็กขาเหลือง



แถบสีดำบนหน้าผากหนา และกว้างกว่า นกหัวโตเล็กขาเหลืองมาก

นกเด็กไม่มีสีดำบนใบหน้า แถบคิ้วและหน้าสีน้ำตาลส้ม



นกหัวโตชาดำ

Kentish Plover (*Charadrius alexandrinus*)

นกหัวโตขนาดเล็ก พบได้ในแหล่งน้ำหลายประเภท ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม เช่น นาเกลือ ชายหาด แม่น้ำ หรือหนองน้ำขนาดใหญ่



Non-breeding

มีแถบสีขาวยาวรอบคอ (collar) แต่บางตัวอาจแคบมาก จนดูเหมือนสีน้ำตาลที่ท้ายทอย เชื่อมกับแผ่นหลัง

ขาอาจเป็นสีดำ หรือสีอื่นก็ได้ บางครั้งเป็นสีน้ำตาลแกมเหลือง หรือแม้แต่เทาอมชมพู



Immature



Breeding

Ssp. alexandrinus

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีกระหม่อมสีน้ำตาลแดงอมส้ม และมีแถบสีดำบริเวณใบหน้า หน้าผาก และข้างอกชัดเจน

ชนิดย่อย *nihonensis* (อาจพบได้) สีซีดกว่า ขาสีเทาอมชมพู



Breeding

Ssp. nihonensis

นกหัวโตหน้าขาว

Swinhoe's Plover (*Charadrius dealbatus*)

นกหัวโตขนาดเล็ก สถานภาพยังไม่ชัดเจน บางตำราจัดให้เป็นเพียงชนิดย่อยของนกหัวโตชาดำ มีรายงานจากพื้นที่ชายฝั่งเพียงไม่กี่แห่ง แต่พบเป็นประจำบริเวณแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี



Non-breeding

ปากยาวและหนากว่า
นกหัวโตชาดำ

ชุดขนสีอ่อนกว่านกหัวโตชาดำ
โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า



Non-breeding



Breeding

ช่วงฤดูผสมพันธุ์ใบหน้าสีขาว
ไม่มีแถบคาดตาสีดำ

ขาสีเนื้อ ลำตัวด้านบนสีน้ำตาล
อ่อนกว่านกหัวโตชาดำ



Breeding

นกหัวโตมลายู

Malaysian Plover (*Charadrius peronii*)

นกหัวโตขนาดเล็ก เป็นนกประจำถิ่นตามพื้นที่ชายฝั่ง
ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน สถานภาพเสี่ยงถูกคุกคาม
จากการรบกวนโดยมนุษย์ และการสูญเสียถิ่นอาศัย



ลักษณะคล้ายนกหัวโตสีดำ
แต่ลำตัวด้านบนมีขอบขนสี
อ่อน ทำให้ดูหลังลายมากกว่า
นกหัวโตสีดำ

เพศผู้มีกระหม่อมสีน้ำตาลส้ม
ซีดๆ มีแถบสีดำบนหน้าผาก
ใบหน้า และรอบคอ



เพศเมียไม่มีสีดำบนใบหน้า
และรอบคอ แต่มีแถบสีน้ำตาล
ส้มวนรอบคอ



นกหัวโตทรายเล็ก

Lesser Sand Plover (*Charadrius mongolus*)



ปากค่อนข้างบางและสั้น ดู “สมส่วน” กับขนาดหัว ไม่มี collar สีขาวรอบคอ เหมือนนกหัวโตชาดำ

ส่วนมากขาสีดำ แต่บางตัวอาจเป็น สีเขียวแกมเหลือง

ชุดขนฤดูผสมพันธุ์ใส่หน้ากากสีดำ หน้าผากดำเกือบล้วน



ชนิดย่อย *mongolus/stegmanni* (อาจพบได้) ปากหนาสั้นกว่า และมีสีขาวที่หน้าผากในช่วงฤดูผสมพันธุ์

นกหัวโตขนาดกลาง พบในบริเวณชายฝั่งเป็นหลัก แต่บางครั้งอาจพบในแหล่งน้ำจืดระหว่างอพยพผ่าน มักพบยืนพักรวมกันเป็นฝูงใหญ่

นกหัวโตทรายใหญ่

Greater Sand Plover (*Charadrius leschenaultii*)



ปากอวบหนาใหญ่กว่านกหัวโตทรายเล็ก
จุดขนฤดูผสมพันธุ์หน้าผากขาว



ตาโตกว่า
นกหัวโตทรายเล็ก



ต้องระวังนกหัวโตทรายเล็กบางตัว
ที่อาจปากยาวกว่าปกติ แต่ความหนา
ไม่เท่านกหัวโตทรายใหญ่

นกหัวโตขนาดกลาง พบในบริเวณชายฝั่งเป็นหลัก แต่
บางครั้งอาจพบในแหล่งน้ำจืดระหว่างอพยพผ่าน มักพบ
รวมกันเป็นฝูงใหญ่ หรือปะปนมาในฝูงนกหัวโตทรายเล็ก



นกหัวโตขายาว

Oriental Plover (*Charadrius veredus*)



Non-breeding

รูปร่างเพรียวยาว ขาวกว่า
นกหัวโตชนิดอื่นๆ

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีหัวและคอสีขาว
อกมีแถบสีน้ำตาลแดงและดำ

นกหัวโตขนาดค่อนข้างใหญ่ หายาก พบได้ใน
พื้นที่หลายประเภท ตั้งแต่พื้นที่ชายฝั่ง ไปจนถึง
ทุ่งโล่งที่แห้งแล้งในแผ่นดินที่ห่างไกลจากทะเล



Non-breeding

ปากเรียวยาว และปลายแหลมมาก ต่างจากกลุ่มนกหัวโตทราย



Male breeding



BCST
สมาคมอนุรักษ์นก
และธรรมชาติแห่งประเทศไทย

© Yanin Muzika

วงศ์นกชายเลน (Scolopacidae)

12 สกุล (genus) เป็นวงศ์ที่มีความหลากหลายมาก ส่วนมากมีปากค่อนข้างยาวเพื่อใช้หาอาหารในโคลนเลน
ทุกชนิดเป็นนกอพยพที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

Scolopax

1. นกปากซ่อมดง (Eurasian Woodcock; *Scolopax rusticola*)

Lymnocyrtus

1. นกปากซ่อมเล็ก (Jack Snipe; *Lymnocyrtus minimus*)

Gallinago

1. นกปากซ่อมพง (Wood Snipe; *Gallinago nemoricola*)
2. นกปากซ่อมหางเข็ม (Pintail Snipe; *Gallinago stenura*)
3. นกปากซ่อมสวินโฮ (Swinhoe's Snipe; *Gallinago megala*)
4. นกปากซ่อมหางพัด (Common Snipe; *Gallinago gallinago*)

นกปากซ่อมดง

Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*)

กระหม่อมและท้ายทอยมีแถบหนาสีน้ำตาลเข้ม สลับกับ
แถบสีอ่อน เห็นได้ชัดเจนต่างจากนกปากซ่อมชนิดอื่น



ลำตัวด้านล่างมีลายขวางสีน้ำตาลเข้มถี่ๆ ตั้งอกจนถึงท้อง

นกปากซ่อมที่ปรับตัวให้อาศัยอยู่ในป่าเป็นหลัก
มักพบตามแอ่งน้ำในป่าดิบเขา แต่บางครั้งอาจ
พบในพื้นที่ราบได้เช่นกัน หากินตลอดเวลากลางวัน
และกลางคืน มักยืนนิ่งเพื่อพรางตัวจากศัตรู



BCST
สมาคมอนุรักษ์นก
และธรรมชาติแห่งประเทศไทย



นกปากซ่อมเล็ก

Jack Snipe (*Lymnocyrtes minimus*)

แถบสีน้ำตาลเข้มสองแถบเหนือตา ทำให้ดูเหมือน
มีคิ้ว 2 ชั้น ต่างจากนกปากซ่อมชนิดอื่น



ปากค่อนข้างสั้น

ไม่มีลายขวางที่ท้อง

นกปากซ่อมขนาดเล็ก หายากมาก มีเพียงไม่กี่รายงานเท่านั้น
จากภาคเหนือและภาคกลาง มีอุปนิสัยโยกตัวขึ้นลงขณะเดิน

มักไม่ค่อยบินหนี
แต่หมอบนิ่งเพื่อพรางตัว



ขนาดตัวเล็กกว่านกปากซ่อมชนิดอื่น
เทียบกับนกปากซ่อมหางพัด (ด้านหลัง)



นกปากซ่อมพง

Wood Snipe (*Gallinago nemoricola*)

กระหม่อมไม่มีลายบังสีเข้มและอ่อน

สลับกันแบบนกปากซ่อมดง

ปากค่อนข้างสั้น



© Sompong Nuamsawat



© James Eaton

มีลายขวางสีน้ำตาลเข้มกระจายทั่วท้อง

คล้ายกับนกปากซ่อมดง แต่อกและคอมีลายขีด



© James Eaton

หายากมาก มีเพียงไม่กี่รายงานจากบนภูเขาสูงทางภาคเหนือ อาจพบได้ในแอ่งน้ำ ลำธาร พุ่มนาหรือที่โล่งในป่าดิบเขา



BCST
สมาคมอนุรักษ์นก
และธรรมชาติแห่งประเทศไทย

นกปากซ่อมหางเข็ม

Pintail Snipe (*Gallinago stenura*)

หนึ่งในนกปากซ่อมที่พบได้บ่อยที่สุด มักพบในแหล่งน้ำจืดหลายประเภท เช่น หนอง บึง ทุ่งนา รวมทั้งทุ่งหญ้าสั้นๆ หรือบางครั้งอาจพบตามแหล่งน้ำในป่า



แถบสีน้ำตาลเข้มบริเวณหัว
ตา แคบมาก

ปากไม่ยาวมาก

ใต้ปีกสีขาว มีลายขวาง
สีน้ำตาลเข้มถี่ๆ กระจายอยู่
ทั่วทั้งปีก



มักเห็นขนหางคู่นอก (เข็ม) ขณะอาบแดด
โซร้งขน หรือบีดซี่เกียจ



สีของชุดขนอาจแปรผันได้
พอสมควร บางตัวอาจสีขาวซีด
หรือสีน้ำตาลแดงกว่าตัวอื่น



นกปากซ่อมสวินโฮ

Swinhoe's Snipe (*Gallinago megala*)

นกหายากหรืออาจถูกมองข้ามเพราะจำแนกจากนกปากซ่อมหางเข็มได้ยากมาก ไม่สามารถจำแนกได้อย่างชัดเจน หากไม่เห็นขนหางคู่นอก (เข็ม)



พยายามเฝ้าดูพฤติกรรมขณะ
พักผ่อน มักมีโอกาสเห็นขน
หางคู่นอก ขณะกำลัง
อาบแดด ไซร์ขน หรือบินขึ้น
เฉียด



ขนหางคู่นอก (เข็ม) กว้างกว่าของ
นกปากซ่อมหางเข็ม



สีของชุดขนอาจแปรผันได้
พอสมควร บางตัวอาจสีขาวยซีด
หรือสีน้ำตาลแดงกว่าตัวอื่น
ไม่ต่างจากนกปากซ่อมหางเข็ม



นกปากซ่อมหางพัด

Common Snipe (*Gallinago gallinago*)

หนึ่งในนกปากซ่อมที่พบได้บ่อยที่สุด พบได้ในแหล่งน้ำหลายประเภท ทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อย เช่น หนอง บึงทุ่งนา และป่าชายเลน



ปากยาวมาก (ยาวกว่านกปากซ่อมหางเข็ม/สวินโฮ)

ได้ปีกมีสีขาวยาวกว่านกปากซ่อมหางเข็ม/สวินโฮ

หางยาวมาก ยื่นออกมาจากปลายปีกชัดเจน




แถบสีน้ำตาลเข้มบริเวณหัวตา กว้างกว่านกปากซ่อมหางเข็ม/สวินโฮ



ขนหางคู่บนไม่เป็น “เข็ม” แต่มีขนาดเท่าๆ กัน เมื่อกางออกดูคล้ายพัด





นกปากซ่อมหางเข็ม

นกปากซ่อมสวินโฮ

นกปากซ่อมหางพัด

วงศ์นกชายเลน (Scolopacidae)

Limnodromus

1. นกช่อมทะเลปากยาว (Long-billed Dowitcher; *Limnodromus scolopaceus*)
2. นกช่อมทะเลอกแดง (Asian Dowitcher; *Limnodromus semipalmatus*)

Limosa

1. นกปากแฉ่นหางดำ (Eastern Black-tailed Godwit; *Limosa melanuroides*)
2. นกปากแฉ่นหางลาย (Bar-tailed Godwit; *Limosa lapponica*)

Numenius

1. นกอีโก้ยจิ๋ว (Little Curlew; *Numenius minutus*)
2. นกอีโก้ยเล็ก (Whimbrel; *Numenius phaeopus*)
3. นกอีโก้ยใหญ่ (Eurasian Curlew; *Numenius arquata*)
4. นกอีโก้ยตะโพกสีน้ำตาล (Far Eastern Curlew; *Numenius madagascariensis*)

นกช่อมทะเลปากยาว

Long-billed Dowitcher (*Limnodromus scolopaceus*)



ปากสองสี โคนปากสีเขียวแกมเหลือง
ปลายปากสีดำ

ขาสีสีเขียวแกม
เหลือง



ขนาดตัวเล็กกว่านกปากแอน
หางดำ (2 ตัวขาว) อย่างชัดเจน



ขนคลุมใต้ปีก ตะโพกและหาง
มีลายขวางสีเทาและดำ กระจายอยู่
ทั่วไป



นกชายเลนขนาดปานกลาง หัวและปากคล้ายนก
ปากช่อม (snipe) แต่ตัวใหญ่และยาว หายาก มัก
พบปะปนกับนกปากแอนหางดำ หรือนกชายเลนอื่นๆ



นกช่อมทะเลอกแดง

Asian Dowitcher (*Limnodromus semipalmatus*)



ปากยาวตรงสีดำ ปลายปากทู่
โคนปากล่างอาจมีสีชมพู

ขาขาวสีดำ



ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีหัว ออกและท้อง
สีน้ำตาลแดงเข้ม ไม่มีลายดำ



ขนคลุมใต้ปีกขาว ไม่มีลาย
ต่างจากนกช่อมทะเลปากยาว



นกชายเลนขนาดปานกลาง หัวและปากคล้ายนก
ปากช่อม (snipe) แต่ตัวใหญ่และขาขาว มักพบเป็น
กลุ่มเล็กๆ ปะปนกับนกปากแอนหางดำ

นกปากแอ่อนหางดำ

Eastern Black-tailed Godwit (*Limosa melanuroides*)

นกชายเลนขนาดใหญ่ ปากและขายาวมาก มักพบหากินและพักผ่อนรวมกันเป็นฝูงใหญ่ พบได้ทั้งในพื้นที่ชายฝั่ง และแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ หรือทุ่งนา



ปากยาวตรง โคนปากสีชมพู ปลายปากสีดำ ตัดกันชัดเจน

ขณะบินเห็นแถบสีขาวดำบน ปีก และหาง ตัดกันชัดเจน ขนคลุมใต้ปีกขาว ไม่มีลาย

ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลปนเทา เรียบ ไม่มีลวดลาย



เพศผู้ (ซ้าย) ขนาดตัวเล็กกว่า เพศเมีย (ขวา) ค่อนข้างชัดเจน



ช่วงฤดูผสมพันธุ์หัวและอกเป็นสีน้ำตาลแดง ท้องมีลายเป็นสีดำ



นกปากแอนหางลาย

Bar-tailed Godwit (*Limosa lapponica*)

นกชายเลนขนาดใหญ่ ปากและขายาวมาก
มักพบหากินและพักผ่อนรวมกันเป็นฝูงใหญ่
พบได้ตามพื้นที่ชายฝั่ง



ปากยาว ปลายปากแอนขึ้น
เล็กน้อย โคนปากสีชมพู
ปลายปากสีดำ

หาง ตะโพก และขนคลุม
ใต้ปีกสีขาว มีลายขวาง
สีเทาเข้มถี่ๆ

ขาวยาวสีดำ



กระหม่อม หลังคอ และลำตัวด้านบนสีลาย
สีน้ำตาลเข้มกระจายทั่วไป



ช่วงฤดูผสมพันธุ์หัว ออก และ
ท้อง สีน้ำตาลแดงเข้ม ไม่มีลาย



นกอีโก้ยจิ๋ว

Little Curlew (*Numenius minutus*)

ปากแหลมและสั้นมากเมื่อเทียบกับนกอีโก้ยชนิดอื่น
หัวเล็ก คอเรียบบาง



หายากมาก มีเพียงไม่กี่รายงานช่วงอพยพผ่าน
เท่านั้น มักพบในพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้งกว่านก
อีโก้ยชนิดอื่น



ขนาดตัวเล็กกว่า ปากสั้นกว่า นกอีโก้ยเล็ก (ซ้าย) อย่างชัดเจน



นกอี๊กอยเล็ก

Whimbrel (*Numenius phaeopus*)



กระหม่อมมีแถบสีน้ำตาลเข้มหนา
ปากค่อนข้างสั้น โคนปากล่างสีชมพู

ขาและเท้าสีเทาอมฟ้า



ชนิดย่อย *phaeopus* มีได้ปีก
และตะโพกขาว



ช่วงฤดูผสมพันธุ์ปากเปลี่ยนเป็นสีดำล้วน

ชนิดย่อย *variegatus* มีลายขวาง
ถี่ๆ สีน้ำตาลเข้มทั่วใต้ปีกและตะโพก



นกชายเลนขนาดปานกลาง ปากแหลมโค้งลงชัดเจน
พบในพื้นที่ชายฝั่งเป็นหลัก แต่อาจพบตามแหล่งน้ำ
จืดระหว่างช่วงอพยพผ่าน

นกอีโก้ยใหญ่

Eurasian Curlew (*Numenius arquata*)



ปากยาวมาก ปลายปากโค้งลง
โคนปากล่างมีสีชมพูเล็กน้อย

ท้องและกันสีขา



ตะโพกสีขาสะอาดไม่มีลาย
ขนหางสีสีขาว มีลายขวางสีน้ำตาลเข้ม



ขณะบินเห็นได้ปากสีขาวสะอาด



นกชายเลนขนาดใหญ่ ปากยาวมากและโค้งลงชัดเจน
มักหากินและยืนพักผ่อนรวมกันเป็นฝูง หาดอาหารใน
หาดเลน ช่วงน้ำขึ้นอาจพบในนาเกลือ

นกอี๊กอยตะโพกสีน้ำตาล

Far Eastern Curlew (*Numenius madagascariensis*)



© Thanee Wongniwatkajorn



Immature

โดยปกติปากยาวกว่า
นกอี๊กอยใหญ่

นกเด็กปากสั้นกว่า อาจทำให้สับสน

ท้องและกันสีน้ำตาล
เหลือง



ตะโพกสีน้ำตาลเหลืองเช่นเดียวกับหลัง
และหาง มีลายขวางถี่ๆ สีน้ำตาลเข้ม
กระจายอยู่ทั่วตะโพก หาง และใต้ปีก



© Thanee Wongniwatkajorn



นกชายเลนขนาดใหญ่ หายาก มักพบครั้งละไม่กี่ตัว
ปะปนอยู่ในฝูงของนกอี๊กอยใหญ่ สถานภาพใกล้สูญ
พันธุ์ (Endangered) ในระดับโลก

วงศ์นกชายเลน (Scolopacidae)

Tringa

1. นกทะเลขาแดงลายจุด (Spotted Redshank; *Tringa erythropus*)
2. นกทะเลขาแดงธรรมดา (Common Redshank; *Tringa totanus*)
3. นกชายเลนบึง (Marsh Sandpiper; *Tringa stagnatilis*)
4. นกทะเลขาเขียวธรรมดา (Common Greenshank; *Tringa nebularia*)
5. นกทะเลขาเขียวลายจุด (Nordmann's Greenshank; *Tringa guttifer*)
6. นกชายเลนเขียว (Green Sandpiper; *Tringa ochropus*)
7. นกชายเลนน้ำจืด (Wood Sandpiper; *Tringa glareola*)
8. นกตีนเหลือง (Grey-tailed Tattler; *Tringa brevipes*)

Xenus

1. นกชายเลนปากแอน (Terek Sandpiper; *Xenus cinereus*)

Actitis

1. นกเด้าดิน (Common Sandpiper; *Actitis hypoleucos*)

Arenaria

1. นกพลิกหิน (Ruddy Turnstone; *Arenaria interpres*)

นกทะเลขาแดงลายจุด

Spotted Redshank (*Tringa erythropus*)

พบได้ทั้งในบริเวณน้ำจืดและน้ำเค็ม เช่น นาเกลือ
หนอง บึง และทุ่งนา



ปากยาวมาก ปลาย
แหลมจู่มน โคนปาก
ล่างสีแดงสด

ขาเรียวยาว
สีแดงสด



ชุดขนฤดูผสมพันธุ์มีลำตัวสีดำ และมีลาย
จุดสีขาวบนหลัง และวงรอบตาสีขาว

ตะโพกและหางมีลายขวางถี่ๆ ขอบปากไม่มีแถบขาว



แข้ง (tarsus) และน่อง (tibia) ยาว
กว่านกทะเลขาแดงธรรมดา



นกทะเลขาแดงธรรมดา

Common Redshank (*Tringa totanus*)

พบบริเวณพื้นที่ชายฝั่งเป็นหลัก บางครั้งอาจพบในแหล่งน้ำ
จืดในแผ่นดินช่วงฤดูอพยพผ่าน


ช่วงฤดูผสมพันธุ์ มีลายขีดสีดำทั่วลำตัวด้านบน
ชุดขนสีน้ำตาลสดขึ้น โคนปากและขาสีแดงสด



Non-breeding

ปากสั้นอวบกว่านก
ทะเลขาแดงลายจุด
โคนปากสีส้ม ปลาย
ปากดำ

ขาสีส้ม แข็ง (tarsus)
และน่อง (tibia) สั้น
กว่านกทะเลขาแดงลาย
จุด



Breeding

ตะโพกขาว และมีแถบขาวขนาดใหญ่บริเวณขอบปีก



Immature

นกเด็กมีลายจุดสีน้ำตาลเข้มและ
น้ำตาลเหลืองกระจายทั่วลำตัว
ด้านบน โคนปากและขาสีส้ม



Non-breeding

นกชายเลนบึง

Marsh Sandpiper (*Tringa stagnatilis*)

รูปร่างเพรียวยาว เดินหาอาหารในน้ำค่อนข้างลึก บางครั้ง
ว่ายน้ำหาอาหาร มักพบในพื้นที่ชายฝั่งเป็นหลัก แต่อาจพบ
ไกลจากทะเลได้ระหว่างอพยพผ่าน



Non-breeding

รูปร่างเพรียวยาว หัวเล็ก
ลำตัวด้านบนสีเทาปนน้ำตาล
ค่อนข้างเรียบ ไม่มีลาย

ขายาวมากสีเขียวแกมเหลือง



Non-breeding

ปากแหลมยาวคล้ายเข็มสีดำ
โคนปากสีเขียวแกมเหลืองเล็กน้อย



Breeding

ช่วงฤดูผสมพันธุ์หัวมีลายจุดสี
ดำกระจายทั่วทั้งลำตัวด้านบน



Breeding

นกทะเลขาเขียวธรรมดา

Common Greenshank (*Tringa nebularia*)

พบได้ทั้งในบริเวณน้ำจืดและน้ำเค็ม เช่น นาเกลือ
หนอง บึง และทุ่งนา มักพบหากินเดี่ยวๆ หรือปนกับนก
ชายเลนชนิดอื่น



ปลายปากงอนขึ้น
เล็กน้อย โคนปากสี
เทาชมพู ปลายปาก
แหลมสีดำ

ลำตัวด้านบนสีเทา มี
ลายขีดสีเข้มบางๆ
กระจายทั่วไป

ชุดขนฤดูผสมพันธุ์มีลายจุดและขีดสีดำทั่วลำตัว



แข้ง (tarsus) และน่อง (tibia) ยาว
กว่านกทะเลขาเขียวลายจุด



นกทะเลขาเขียวลายจุด

Nordmann's Greenshank (*Tringa guttifer*)

หายากและใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) ในระดับโลก
แต่พบได้เป็นประจำในบริเวณชายฝั่งทั้งอ่าวไทย และ
ฝั่งอันดามัน



ปากอวบหนากว่านก
ทะเลขาเขียวธรรมดา
โคนปากสีเขียวเหลือง
ปลายปากทู่ สีดำ
งอนขึ้นเล็กน้อย

ลำตัวด้านบนสีเทา
เรียบ ไม่มีลายจุด
หรือขีดสีดำ



ชุดขนฤดูผสมพันธุ์มีลายจุดและขีดสีดำทั่วลำตัว



แข้ง (tarsus) และน่อง (tibia)
สั้นกว่านกทะเลขาเขียวธรรมดา



นกชายเลนเขียว

Green Sandpiper (*Tringa ochropus*)

พบตามแหล่งน้ำจืดทางตอนบนของประเทศเป็นหลัก
เช่น คลอง หนอง บึง ทุ่งนา ทางภาคกลางและภาคใต้
มีรายงานน้อย



Non-breeding

© Lo Chun Fai

หัวและลำตัวด้านบนสีน้ำตาล
ค่อนข้างเรียบ มีสีขาวที่หัวตา
และวงรอบตา

ข้างอกเป็นปื้นสีน้ำตาล ตัดกับ
ท้องและสีข้างขาวสะอาด



© Neoh Hor Kee

ใต้ปีกสีน้ำตาลเข้ม



Breeding

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีลายจุดสีขาว
กระจายทั่วหลัง หัวและคอมี
เส้นสีขาวสลับน้ำตาล



Immature

© Apisit Wilajit

นกชายเลนน้ำจืด

Wood Sandpiper (*Tringa glareola*)

พบได้บ่อยตามแหล่งน้ำหลายประเภท ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มทั่วประเทศ เช่น หนอง บึง พังนา และนาเกลือ



คิ้วขาวสีขาวยาวต่างจาก
นกชายเลนเขียว

ลำตัวด้านบนสีน้ำตาล ขอบขน
มีลายจุดสีอ่อนกระจายทั่ว
ลำตัวด้านบน ข้างอกสีน้ำตาล
เทาเล็กน้อย



ได้ปีกขาว มีลายขวางสีน้ำตาลเข้ม



ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีลายจุดสีขาว
กระจายทั่วหลัง หัวและคอมี
เส้นสีขาวสลับน้ำตาล



นกตีนเหลือง

Grey-tailed Tattler (*Tringa brevipes*)

หายาก พบได้เฉพาะพื้นที่ชายฝั่ง เช่น หาดหิน หาดทราย หาดเลน บางครั้งพบเกาะพักในนาเกลือ



ลำตัวด้านบนสีเทา
น้ำตาลเรียบ ไม่มี
ลวดลาย

ขาอ่อนข้างสั้นสี
เหลือง สีสดขึ้น
ในช่วงฤดูผสมพันธุ์



ชุดขนฤดูผสมพันธุ์มีลายขวางสีเทาถี่ๆ ทั่วลำตัวด้านล่าง



ขาและเท้าสีเหลืองใน
ทุกวัยและชุดขน



นกชายเลนปากแฉ่น

Terek Sandpiper (*Xenus cinereus*)

Non-breeding



© Thanee Wongniwatkajorn

ปากยาวมาก โคนปากสีส้ม
ปลายปากดำและงอนขึ้น


ขาสั้นสีส้มชัดเจน

Breeding



ฤดูผสมพันธุ์มีแถบสีดำที่หัวไหล่

Immature



ใบหน้า ออก ลำตัวด้านล่างสีขาว
กระหม่อม แก้ม และลำตัวด้านบนสีเทา
บนน้ำตาล ค่อนข้างเรียบ ไม่มีลาย

มีแถบสีขาวบริเวณขอบปีก

นกชายเลนขนาดเล็ก พบบริเวณชายฝั่งเป็นหลัก มักพบหากินหรือเกาะพักปะปนกับนกชายเลนชนิดอื่น แต่บางครั้งอาจพบยืนพักรวมกันเป็นฝูงใหญ่



© Jemi & John Holmes

นกเต้าดิน

Common Sandpiper (*Actitis hypoleucos*)

พบได้บ่อยตามแหล่งน้ำหลายประเภท ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มทั่วประเทศ เช่น หนอง บึง ทุ่งนา และนาเกลือ มีนิสัยกระโดดทางขึ้นลงตลอดเวลาขณะเดินทางหาอาหาร



Non-breeding

หัว ออก ลำตัวด้านบนสีน้ำตาล
ข้างอกมีแถบสีขาวขึ้นมาถึง
บริเวณหัวไหล่

ขนคลุมปีกด้านบนมีลายขวาง
สีดำ



ใต้ปีกมีแถบสีขาวและน้ำตาลเข้มชัดเจน



Breeding

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีลายจุดและ
ขีดสีน้ำตาลเข้มบริเวณหน้า
คอ และอก

หางยาวยื่นเลยออกมา
จากปลายปีก



Non-breeding

นกพลิกหิน

Ruddy Turnstone (*Arenaria interpres*)

Non-breeding



ปากสั้นสีดำ ปลายแหลม

ขาสั้นมากสีส้ม

Non-breeding



มีอุปนิสัยใช้ปากพลิกก้อนหิน ดิน หรือเปลือกหอย เพื่อหาอาหารที่ ซ่อนอยู่ข้างใต้

Breeding



ช่วงฤดูผสมพันธุ์ขาสีส้มสดขึ้น หัวและอกมีลายสีขาวดำ หลังมีสีน้ำตาลแดง



© Jaysukh Parekh

รูปร่างแตกต่างจากนกชายเลนชนิดอื่น ขาสั้น ปากสั้น มักพบรวมกันเป็นฝูงขนาดกลาง หรือปะปนกับนกชายเลนชนิดอื่นตามชายหาด และนาเกลือ

วงศ์นกชายเลน (Scolopacidae)

Calidris

1. นกนํ้าต๋ใหญ่ (Great Knot; *Calidris tenuirostris*)
2. นกนํ้าต๋เล็ก (Red Knot; *Calidris canutus*)
3. นกคอสั้นตีนไว (Sanderling; *Calidris alba*)
4. นกสตี้นท์คอแดง (Red-necked Stint; *Calidris ruficollis*)
5. นกสตี้นท์เล็ก (Little Stint; *Calidris minuta*)
6. นกสตี้นท์อกเทา (Temminck's Stint; *Calidris temminckii*)
7. นกสตี้นท์นํ้ายาว (Long-toed Stint; *Calidris subminuta*)
8. นกชายเลนกระหม่อมแดง (Sharp-tailed Sandpiper; *Calidris acuminata*)
9. นกชายเลนปากโค้ง (Curlew Sandpiper; *Calidris ferruginea*)
10. นกชายเลนท้องดำ (Dunlin; *Calidris alpina*)
11. นกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed Sandpiper; *Calidris pygmaea*)
12. นกชายเลนปากกว้าง (Broad-billed Sandpiper; *Calidris falcinellus*)
13. นกรัฟ (Ruff; *Calidris pugnax*)

Phalaropus

1. นกลอยทะเลคอแดง (Red-necked Phalarope; *Phalaropus lobatus*)
2. นกลอยทะเลสีแดง (Red Phalarope; *Phalaropus fulicarius*)

นกน็อตใหญ่

Great Knot (*Calidris tenuirostris*)

สถานภาพระดับโลกใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) แต่สามารถพบได้เป็นประจำในเมืองไทย หาอาหารรวมกันเป็นฝูงใหญ่ในหาดเลน และรวมฝูงพักในนาเกลือ หรือบนชายหาด



ปากยาวตรง ปลายปากแหลม

มีลายจุดสีเทาเข้มกระจายทั่วอก

ปกติขาสีเหลืองแกมเขียว บางครั้งอาจเป็นสีเทาดำ

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีลายจุดสีดำกระจายทั่วอกและลำตัว ด้านบนมีขนสีน้ำตาลแดงขึ้นแซม



ขนาดตัวใหญ่กว่า ปากและขายาวกว่า นกน็อตเล็ก (ซ้าย)



นกน็อตเล็ก

Red Knot (*Calidris tenuirostris*)

อุปนิสัยคล้ายนกน็อตใหญ่ และมักพบอาศัยอยู่ร่วมกัน หาอาหาร
รวมกันเป็นฝูงใหญ่ในหาดเลน และรวมฝูงพักในนาเกลือ หรือบน
ชายหาด



Non-breeding

ปากสั้นกว่า
นกน็อตใหญ่

ลวดลายบนลำตัว
ด้านบนไม่ชัดเจน
หลังค่อนข้างเรียบ



Great Knot

Red Knot

ขนาดตัวเล็กกว่า ปากและขาสั้นกว่า
นกน็อตใหญ่ (ซ้าย)



Breeding

สีขาอาจแปรผันได้มาก ตั้งแต่ดำ
จนถึงเขียวแกมเหลือง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีชุดขนสี
น้ำตาลแดงเข้ม



Breeding

© Khemthong Tonsakulrungruang

นกคอสั้นตีนไว

Sanderling (*Calidris alba*)

รูปทรงคล้ายนกสตีนท์ แต่ขนาดตัวใหญ่กว่าเล็กน้อย มักพบหากินเป็นฝูงตามชายหาด โดยเฉพาะหาดทราย แต่บางครั้งพบยืนพักในนาเกลือปะปนกับนกชายเลนชนิดอื่น



Non-breeding

© Sompong Nuamsawat

ปากแหลมตรง
สีดำ

ชุดขนสีขาวเทา
มีสีดำบริเวณ
หัวไหล่

ขาสั้น สีดำ



© Khemthong Tonsakulrungruang

วิ่งหาอาหารรวมกันเป็นฝูงบนชายหาด



Immature

© Dave Bakewell

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีขนสีน้ำตาล
แดงเข้มขึ้นแซมตามลำตัว



Breeding

© Baatargal Otgonbayer

นกสตีนท์คอแดง

Red-necked Stint (*Calidris ruficollis*)

หนึ่งในนกชายเลนที่มีจำนวนมากที่สุดในเมืองไทย พบได้ในพื้นที่ชายฝั่งเป็นหลัก เช่น หาดเลน และนาเกลือ มีรายงานจากแหล่งน้ำจืดน้อยมาก มักหากินรวมกันเป็นฝูงใหญ่



Non-breeding

ลำตัวยาว โดยเฉพาะช่วงท้าย
ของลำตัว ปลายปีกยาว
ลำตัวด้านบนมีลายขีดสีดำ

ปากสั้น ปลายแหลม สีดำ

ขาสั้น สีดำ



Non-breeding

ช่วงผลัดขนอาจทำให้สับสนกับนกสตีนท์ชนิดอื่น



Breeding

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีคอและ
ใบหน้าสีน้ำตาลแดง และมีขน
สีน้ำตาลแดงแซมบริเวณ
ด้านบนของลำตัว



Post-breeding

นกสตีนท์เล็ก

Little Stint (*Calidris minutus*)

หายากหรืออาจถูกมองข้าม เพราะจำแนกจากนกสตีนท์คอแดงได้ยาก โดยเฉพาะในชุดขนนอกฤดูผสมพันธุ์ พบได้ในพื้นที่ลักษณะเดียวกันกับนกสตีนท์คอแดง



Non-breeding

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีขนสีน้ำตาลแดงแซมบริเวณด้านบนของลำตัว ยกเว้นที่คอ

ปากเรียวแหลมกว่า นกสตีนท์คอแดง

ขาสีดำ น่อง (tibia) ยาวกว่านกสตีนท์คอแดง



Breeding



Red-necked

Little

รูปร่างแตกต่างจากนกสตีนท์คอแดง ตัวกลมสั้นกว่า ปากแหลม และขายาวกว่า



Pre-breeding

นกสตีนท์อกเทา

Temminck's Stint (*Calidris temminckii*)

พบได้ในแหล่งน้ำหลายประเภท ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม เช่น นาเกลือ ทุ่งนา และแม่น้ำขนาดใหญ่ มักหากินเดี่ยวๆ หรือ ปะปนกับนกชายเลนชนิดอื่น



Non-breeding

ปากแหลมสั้นสีดำ

ชุดขนสีเทาเรียบ
ไม่มีลวดลาย



ขาสั้น สีเหลืองแกมเขียว



Pre-breeding

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีลายขีดสีเทา
ทั่วหัวและอก

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีขนสีน้ำตาล
แดงขึ้นแซมทั่วลำตัวด้านบน




Breeding

© Anand Arya

นกสตีนท์นิ้วยาว

Long-toed Stint (*Calidris subminuta*)

พบได้ในแหล่งน้ำหลายประเภท ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม เช่น นาเกลือ และนาข้าว มักหากินเดี่ยวๆ หรือปะปนกับนกชายเลนชนิดอื่น



Non-breeding

ปากแหลม โค้งลง
เล็กน้อย

มีลายขีดสีดำกระจาย
ทั่วลำตัวด้านบน

ขาสั้น สีเหลือง
แกมเขียว



Breeding

ชุดขนฤดูผสมพันธุ์มีสีน้ำตาลแดงสด



นกวัยเด็กลักษณะคล้าย
นกเต็มวัยในชุดขนฤดูผสมพันธุ์

นิ้วเท้าหลังยาวกว่า
นกสตีนท์ชนิดอื่น



Immature

นกชายเลนกระหม่อมแดง

Sharp-tailed Sandpiper (*Calidris acuminata*)

หายาก มักพบช่วงฤดูอพยพผ่าน อาศัยปะปนกับ
นกชายเลนชนิดอื่น ส่วนมากพบในนาเกลือ หรือ
บ่อน้ำกร่อย



ชุดขนคล้ายนกสตี้นท์นิ้วยาว
ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีขนสีน้ำตาล
แดงสดทั่วลำตัวด้านบน

ปากไม่ยาวมาก ปลายแหลม
โคนปากสีเหลืองแกมเขียว

ขาสีเขียวแกมเหลือง



สีสันทคล้ายนกสตี้นท์นิ้วยาว
มาก แต่ขนาดตัวใหญ่กว่าอย่าง
ชัดเจน สัดส่วนหัวดูเล็กกว่าตัว


เปรียบเทียบขนาดกับนกหัวโตทราย



นกชายเลนปากโค้ง

Curlew Sandpiper (*Calidris ferruginea*)

พบได้เป็นจำนวนมากในพื้นที่ชายฝั่ง โดยเฉพาะในอ่าวไทย
ตอนใน หาอาหารในหาดเลน และนาเกลือ มักอาศัย
รวมกันเป็นฝูงปะปนกับนกชายเลนชนิดอื่น



ปากแหลมยาว

โค้งลง

ลำตัวด้านบนสีเทา

น้ำตาลค่อนข้างเรียบ

ขาสีดำ



ชุดขนฤดูผสมพันธุ์มีหัว ออก และท้องสีน้ำตาลแดงเข้ม



ตะโพกสีขาว อาจมีลายสี
น้ำตาลกระจายเล็กน้อย
แต่ไม่มีขีดสีดำตรงกลาง



นกชายเลนท้องดำ

Dunlin (*Calidris alpina*)

หายากหรืออาจถูกมองข้าม เนื่องจากจำแนกจากนกชายเลนปากโค้ง
ได้ค่อนข้างยาก สามารถพบได้ทั้งในแหล่งน้ำเค็มและน้ำจืด มีรายงาน
พบในแหล่งน้ำจืดบ่อยกว่านกชายเลนปากโค้ง



มักมีสีขาเหลืองๆ
รอบดวงตา

ปากค่อนข้างตรงกว่า
นกชายเลนปากโค้ง



ชุดขนฤดูผสมพันธุ์มีแถบสีดำที่ท้อง
และมีขนสีน้ำตาลแดงแซมลำตัวด้านบน



ลำตัวด้านบนสีเทาน้ำตาล
เรียบ ไม่มีลวดลาย

ตะโพกมีแถบสีดำพาดกึ่งกลาง



นกชายเลนปากช้อน

Spoon-billed Sandpiper (*Calidris pygmaea*)

Non-breeding



ปากมีลักษณะเป็นช้อน
แตกต่างจากนกชนิดอื่น

Breeding



ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีใบหน้าและคอสีน้ำตาลแดง

Pre-breeding



Non-breeding



ลักษณะรูปร่างและสีสันทคล้าย
นกสตีตันท์คอแดง และมักพบปะปนอยู่
ในฝูงนกสตีตันท์และนกชายเลนขนาด
เล็กชนิดอื่นๆ



หายาก สถานภาพใกล้สูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง
(Critically Endangered) ในเมืองไทยพบได้ทุกปี
ประมาณ 10 ตัวต่อปี

นกชายเลนปากกว้าง

Broad-billed Sandpiper (*Calidris falcinellus*)

พบค่อนข้างบ่อยในพื้นที่ชายฝั่ง เช่น นาเกลือ และ
หาดเลน มักพบหากินเป็นฝูงปะปนกับนกชายเลน
ขนาดเล็กชนิดอื่น

Non-breeding



มีแถบสีเข้มบริเวณเหนือตา
ทำให้ดูเหมือนมีคิ้ว 2 ชั้น

ปากยาว ปลายปากแหลม
งุ้มลงเล็กน้อย

Pre-breeding



Breeding



ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีขนสีน้ำตาล
แดงขึ้นแซมบริเวณลำตัว
ด้านบน

โคนปากกลมและอวบ

เปรียบเทียบขนาดกับนกหัวโตทราย

Non-breeding



นกรัฟ

Ruff (*Calidris pugnax*)

เพศเมียและตัวผู้
เหลืองแกมเขียว



Female non-breeding



Male non-breeding

ปากแหลมสีดำ
ปลายปากโค้งลงเล็กน้อย
หัวและคอเพรียวยาว

เพศผู้และตัวผู้สีส้ม

เพศผู้ (ซ้าย) ขนาดตัวใหญ่กว่า
เพศเมีย (ขวา) ค่อนข้างมาก



Pre-breeding

© Jaysukh Parekh



Male non-breeding

นกชายเลนขนาดกลาง พบได้ใน
แหล่งน้ำหลายประเภท เช่น นาเกลือ
บ่อน้ำกร่อย หาดเลน ทุ่งนา และ
หนองบึง



ยังไม่เคยมีรายงานของนกที่ผลิตขนเป็นชุดขน
ฤดูผสมพันธุ์อย่างสมบูรณ์ในเมืองไทย

นกลอยทะเลคอแดง

Red-necked Phalarope (*Phalaropus lobatus*)

เท้ามีพังผืดสำหรับว่ายน้ำหาอาหารต่างจากนกชายเลนกลุ่มอื่น ว่ายน้ำวนเป็นวงกลมขณะหากิน มักพบรวมกันเป็นฝูง



Non-breeding

ปากแหลมมาก
คล้ายเข็ม

มีแถบสีดำคาดตา บน
กระหม่อม และ
ด้านบนของปีก



Female breeding

ชุดขนฤดูผสมพันธุ์มีแถบสีน้ำตาลแดงที่คอ หัว
ใบหน้า และหลังสีเทาเข้ม เพศเมียสีเข้มกว่าเพศผู้



Immature

นกเด็กมีลวดลายสีดำเข้ม
ชัดเจน คออาจมีสีน้ำตาลแดง
เรื่อๆ



Male breeding



BCST
สมาคมอนุรักษ์นก
และธรรมชาติแห่งประเทศไทย

นกกลอยทะเลสีแดง

Red Phalarope (*Phalaropus fulicarius*)

อุปนิสัยเหมือนกับนกกลอยทะเลคอแดง หายากมาก มีเพียงไม่กี่รายงานเท่านั้นจากพื้นที่ชายฝั่ง



Immature

ปากกลมหนา
กว่านกกลอยทะเล
คอแดง โคนปากสี
เหลืองเล็กน้อย

ลวดลายสีดำนล่ำตัว
น้อยกว่านกกลอยทะเล
คอแดงมาก

© Sompong Nuamsawat



แผ่นหลังและขนคลุมปีกสีเทา
อ่อน แดงสีดำนทั่วและ
ใบหน้าไม่ชัดเจนเท่านั้นกลอย
ทะเลคอแดง

© Thanee Wongniwatkajorn



Female breeding

© Yann Muzika

ชุดขนฤดูผสมพันธุ์มีชุดขนสีน้ำตาลแดง ใบหน้ามีแถบสี
ขาวและดำ โคนปากเหลือง เพศเมียสีเข้มกว่าเพศผู้



Male breeding

© Jelger Herder